



Buscar en Internet



Actualidad > Sociedad

Actualidad

Lotería

Sorteo de Navidad

Juega en Terra Loterías

PUBLICIDAD

La Bruja de Oro

¡Date prisa que se acaban!

▼ Portada

► Sociedad

· La Familia Real
· Hombre Actual

Provincias

Nacional

Internacional

Sucesos

► Sociedad

Ciencia

Cultura

Lo más insólito

Especiales

Inmobiliario

Finanzas/Invertia

Tecnología

Día en imágenes

Videos

Loterías

El tiempo

Tráfico

Vertele

Chat

Foros

**SOCIEDAD****Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente**

Un estudio realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London, que ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork, señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que 'es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita'. Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

PUBLICIDAD



Terra Actualidad - Europa Press

Enviar a:

Menéame

Digg

Del.icio.us

Technorati

Constitucion Sociedades

Firma Jurídica Especializada Líder en España. SL y SA en 8 horas

www.Eurosl.Com/Constitucion**Venta Sociedades MAD/BCN**

Obtenga una SL inactiva en menos de 24 horas. Precios sin comparación.

www.societalis.com**Sociedades Limitadas**

Sociedad limitada ya constituida. Your company ready made. Holding co

www.limitadas.es**Se el Rey de la Cama**

Remedio Natural para Erecciones Duraderas - Ofertas Gratis En Línea

www.Ultimate-Herbal.ES

Anuncios Google

imprimir enviar a un amigo



Todos los [resultados y la clasificación de la Liga](#)

Vivir

Listas Premios 20Blogs Calle 20 Resultados deportivos

Portada | Tu ciudad » | Gente | TV | Deportes | Motor | Tecnología | Videojuegos | Cine | Música | Zona 20 | **Vivir** | Viajes | Servicios » |

Blogs | Diccionario de sexo | Fotos | Foros | Triviales | Vídeos | Mini20 | Fotos | RSS | Horóscopo | Madrid 11°C Ver más ciudades

Lunes, 24/11/08. Actualizado hace 1 minuto Haz 20minutos.es tu página de inicio | 413.578 lectores diarios (OJD julio 2008)

Enviar Imprimir Artículo 3 de 3 en Vivir (Salud) « Anterior - Siguiente »

¿Hará sol mañana? Callejero y mapa 2008

La exposición a la laca en el embarazo puede provocar malformaciones en el pene

AGENCIAS. 23.11.2008 - 12:53h



Un bebé recién nacido en brazos de su madre. (ARCHIVO) Ampliar foto

Según ha publicado un estudio del Imperial College de Londres. Se debe a un compuesto químico presente en la laca. Este compuesto fue prohibido en juguetes por la UE.

Minuteca todo sobre: [Bebés](#), [Embarazo](#)

La exposición a la laca durante el [embarazo](#) puede aumentar el riesgo de bebés nacidos con **malformaciones en el sistema genito-urinario**, según un estudio del Imperial College de Londres que publica la revista "Environmental Health Perspectives".

Los autores del estudio aseguran que las mujeres que están expuestas a los ftalatos, unos compuestos químicos que se emplean para ablandar el plástico y que están presentes en la laca, podrían correr mayor riesgo de tener hijos con hipospadias, una **anomalía congénita** que evita que el pene se desarrolle correctamente. Los niños que padecen esta malformación suelen presentar el meato urinario en algún lugar de la parte inferior del glande, en el tronco o en la zona de unión entre el escroto y el pene.

Los investigadores aclaran que el peligro no está en el uso doméstico de la laca, sino en el caso de las mujeres embarazadas que están expuestas a **mayores dosis por razones de trabajo**, como en el caso de las peluqueras o trabajadoras de centros de belleza.

El estudio examinó el caso de **471 mujeres que habían tenido hijos con hipospadias** y de un número similar de mujeres con bebés sin malformaciones, y llegó a la conclusión de que la exposición a la laca en las mujeres del primer grupo había doblado la del segundo.

No obstante, el profesor Paul Elliot, del Imperial College de Londres, quiso evitar el alarmismo y manifestó que no está demostrado al cien por cien que la laca, o los ftalatos que contiene, tengan relación directa con este defecto genital. "**Las mujeres no deben alarmarse**".

El estudio añade un poco más de información sobre la percepción médica general que se tiene de estos compuestos químicos, pero será necesario seguir investigando para demostrar que la relación existe", dijo Elliot.

El investigador añadió que "son las mujeres embarazadas las que tienen que decidir si quieren estar expuestas a este riesgo o no" y subrayó que lo que sí deberían hacer como norma es tomar una dosis extra de ácido fólico al inicio del embarazo para prevenir malformaciones como las hipospadias o la espina bífida.

El Parlamento Europeo **prohibió en 2005 el uso de los ftalatos** en la fabricación de juguetes y artículos de puericultura por considerarlos peligrosos para la salud. Estos compuestos están presentes también en lubricantes, disolventes, cosméticos e incluso material médico.

Artículos relacionados

- [¿Hay alteraciones congénitas del pene que impidan la penetración?](#)
- [Arranca el pene del paciente que operaba y lo corta en cachitos por un ataque de nervios](#)
- ["El Cytotec puede producir malformaciones en el bebé"](#)

Enviar a: Menéame Digg Del.icio.us Technorati Yahoo Fresqui

Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido

Por estar conectado el **24 / Noviembre / 2008** a las **09:21** de la mañana

Has sido seleccionado como un posible ganador de un **Audi A5**.

Si has llegado a tiempo, haz click aquí:

[Portada](#)
[Actualidad](#)
[Noticias científicas](#)
[Entrevistas](#)
[Opinión](#)
[Vídeos](#)
[Archivo "Salut i Força"](#)
[Archivo "Salut i Ciència"](#)
[Sobre Salut i Força](#)
[Contacto](#)


En portada

[Identificar los genes...](#)
[Los dentistas aseguran que cada...](#)
[Lanzan una campaña para fomentar...](#)
[Un estudio asocia la laca de...](#)
[Premian al Comib por su ponencia...](#)
[Concierto benéfico a favor de la...](#)
[Más de 10.000 niños españoles...](#)
[La ONCE lanza un cupón especial...](#)
[La osteoporosis genera casi un...](#)
[Joan Profitós Tuset analiza en...](#)
[Sol Meliá cede gratis sus...](#)
[El Congreso instará al Gobierno...](#)
[La depresión será la primera...](#)
[Asociaciones y fundaciones crean...](#)
[Más del 9% de los años...](#)
[Investigadores de terapia...](#)
[Jaume Carbó nuevo Director...](#)

Comentarios recientes

Aún sabiendo que hoy en día son los datos económicos y porcentuales los que... (Josep Ramon Mir)

Una cosa es que lo de las peonadas y las prolongaciones de jornada sea una merienda... (Otro cirujano independiente)

La histerectomía en sí misma no provoca la menopausia, salvo cuando se realiza una... (José Javier Salvá Garau...)

estoy muy angustiada, por todos los síntomas que he escuchado estoy aterrada.... (angeles v.)

Tengo 64 años y hace 5 me sacaron un ovario debido a un quiste de unos 2 cm... (marga)

Estoy diagnosticad de apnea del sueño con índice AH=33/h de sueño, apneas de... (José Seijas Eijo)

Las listas de espera las provocan los mismos medicos y cirujanos del IBsalut, para... (Cirujano Independiente)

La tibolona (Boltin), es un medicamento que posee tres acciones fundamentales: la... (Dr. José Salvá. Ginecólogo)

Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente


E.P.
[Añadir comentario](#)
[Enviar a un amigo](#)
[Enviar a Menéame](#)

Un estudio realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London, que ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork, señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

21 Noviembre, 2008 13:31 [Noticias científicas](#) [↑ Siguiente](#) [↓ Anterior](#) [Comentarios \(0\)](#)

Comentarios

Añadir comentario

Los comentarios son moderados para evitar spam. Esto puede hacer que tu escrito tarde un poco en ser visible.

Título

Texto

Tu nombre

Email

Web

La laca de pelo asociada a una anomalía congénita frecuente

21.11.08 | 14:52. Archivado en Ciencia médica



(PD).-Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente. Señala que a las mujeres que se exponen a este producto durante el primer trimestre de embarazo de forma continuada presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

El estudio ha sido realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London y ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que

la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

Hacer comentario

SALUD

Relacionan una anomalía genital en bebés varones con la laca del pelo

16:16 ☆☆☆☆☆



La laca de pelo podría ser la responsable de una anomalía genital de los recién nacidos llamada hipospadias, según un estudio hecho en el Reino Unido en el que han participado el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork.

EFE Según ha informado el CREAL, el trabajo señala que esta anomalía, en la que la abertura de la uretra no está al final del glande, sino en algún punto entre éste y el perineo, puede estar motivada por los ftalatos que contienen las lacas, unas sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos que provocan malformaciones del sistema reproductivo.

Los ftalatos son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

Los investigadores llegaron a estas conclusiones tras entrevistar por teléfono a 471 madres con hijos que habían sido derivados a cirujanos por hipospadias, y a 490 pacientes de control de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

Los cuestionarios se centraron en una serie de aspectos de la salud de las mujeres y de su estilo de vida, como su ocupación laboral, su posible exposición a sustancias químicas, la historia clínica familiar, si eran vegetarianas, si fumaban o habían ingerido complementos de ácido fólico.

El trabajo detectó que las mujeres que se habían expuesto a laca para el pelo en su lugar de trabajo eran desde oficinistas, azafatas de vuelo o consultoras financieras, hasta mujeres que trabajaban en peluquerías, salones de belleza, centros de investigación química o empleadas de la industria farmacéutica.

Según el investigador Mark Nieuwenhuijsen, del CREAL y uno de los autores del estudio, éste es el trabajo más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y la hipospadias, aunque considera que es necesario seguir estudiando esta relación.

Los investigadores indican que los resultados del estudio también pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular son síntomas de un problema subyacente, y de la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

Se considera que la hipospadias afecta aproximadamente a uno de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a uno de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían.

Generalmente, la hipospadias puede tratarse con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año de edad y se obtienen buenos resultados, sin embargo, los casos más graves pueden originar problemas de fertilidad, así como problemas a la hora de orinar y tener relaciones sexuales.

El nuevo estudio también pone de manifiesto por primera vez que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36% del riesgo de dar a luz a un hijo con esta enfermedad.

Actualmente, los médicos ya recomiendan que se tomen complementos de ácido fólico durante las doce primeras semanas de embarazo para evitar anomalías en el tubo neural, como la espina bífida.

El CREAL es una iniciativa conjunta del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Generalitat de Catalunya especializada en investigación epidemiológica ambiental.

COMPARTIR



¿qué es esto?

ENVIAR PÁGINA >>

IMPRIMIR PÁGINA >>

AUMENTAR TEXTO >>

REDUCIR TEXTO >>

HEMEROTECA

[Volver a la Edición Actual](#)

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM



Los argentinos, sin la Davis

[Ver video >](#)



Chávez gana las elecciones

[Ver video >](#)



Llega el frío a la península

[Ver video >](#)

[más vídeos >](#)

BUSCADOR VIVIENDA



Operación	Tipo de inmueble	Provincia
comprar alquilar	viviendas obra nueva habitación oficinas locales o naves garajes	álava albacete alicante almería andorra asturias

Anunciese gratis

Buscar

El portal inmobiliario de [levante-emv.com](#)

GALERÍAS DESTACADAS

- [El GP de F1 en Valencia](#)
- [Fiesta Vip de la F1 en Viveros](#)
- [Tragedia aérea en Barajas](#)
- [El 'circo' de la F1](#)
- [Ceremonia de Apertura Pekín 2008](#)
- [La futura estación central de Valencia](#)
- [Accidente laboral en el nuevo Mestalla](#)
- [Los animales del Bioparc de Valencia](#)
- [Ceremonia de Clausura Pekín 2008](#)
- [La Tomatina de Buñol](#)
- [Las obras del circuito de F1 en Valencia](#)
- [Las obras del nuevo Mestalla](#)

[Ver más galerías](#)

LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

[levante-emv.com](#) **LO MÁS LEÍDO** **LO MÁS VOTADO**

1. Al desnudo para comprar una ambulancia
2. Canet entra en "pánico colectivo" ante la llegada de Dani el Payaso
3. Francia se retira de la F1 al negarse a construir el circuito urbano que exigía Ecclestone
4. Un enfermo mental degüella a su madre
5. El Supremo obliga a Ercros a pagar la limpieza del suelo que contaminó en la avenida de Francia
6. Adidas vence a La Tomatina
7. Una camiseta multicolor
8. El Consell admite deficiencias en el montaje del puente de l'Assut de l'Or
9. Bancaja se acoge al plan de ayuda del Gobierno que hoy ha comprado activos a 23 entidades
10. A la calle contra la reforma universitaria

PUBLICIDAD

11ª Encuesta
ALMC
a usuarios de Internet
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Viernes, 21.11.2008, 14:51:30



Este invierno NIEVE GARANTIZADA

...y si no hay nieve te devolvemos el dinero

Andorra - Vallnord

H. Husa Patagonia *** MP

6 Dias / 5 Noches
5 dias forfait

286€

TR - IBEX 35: 8.103,60 (+1,44) Valores: ABENGUA 10,50 (+1,16%) | ABERTIS 12,41 (+1,80%) | ACCIONA 65,95 (+0,69%) | ACERINOX 10,00 (+2,99%) | ACS 29,66 (+2,45%) | BANCO POPULAR

Comunidad

- Portada principal
- INS en favoritos
- INS como inicio
- Los Foros
- Mensajes
- Inicio sesión
- Regístrate
- Encuestas
- Mapa Web

Menú Noticias

- Portada Nacional
- Ciencia
- Motor
- Tecnología
- Gente
- Salud
- Sorteos

Economía

- Portada Economía
- Destacados
- Empresas
- Finanzas
- Mercados
- Cotizaciones
- Macroeconomía
- Vivienda
- Energía
- Empleo

Deportes

- Portada Deportes
- Fútbol
- Fórmula 1
- Motociclismo
- Baloncesto
- Tenis
- Golf
- Atletismo
- Ciclismo

Internacional

- Portada Internacional
- Economía
- Política
- Sociedad

Destacados

- Los precios de producción industrial suben un 1,1% en Julio - 02 Sep 2008
- Colonial ultima los detalles de su proceso de refinanciación - 02 Sep 2008
- Comentario de mercado y claves de la sesión - 02 Sep 2008
- Ligeras caídas en las bolsas europeas. Comentario del cierre - 01 Sep 2008
- Comentario de mercado y claves de la sesión - 27 Ago 2008
- El Popular y la Caixa estudian proponer a otros bancos entrar en Colonial

Patrocinado por:

Noticia Ampliada

Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente

BARCELONA, 21 Nov. (Redacción / EP)

Un estudio señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

El estudio ha sido realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London y ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

Participa en los foros de INS

Últimos mensajes

- I. Colonial: Muy interesante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, enviado por Nelo
- I. Colonial: Uffff tocado el 0,38, enviado por Letman
- I. Colonial: Pre: 44 726819 0,39 0,39 60710 5, enviado por Letman
- Destacados: Comentario de mercado y claves de la sesión, enviado por invernews
- I. Colonial: Buenas noches hoy mi comentario, enviado por Nelo
- Nasdaq 100: Hoy he pillado unas pocas LVL, enviado por duman
- Iberia: Todo rojo menos Iberia!!!, enviado por duman
- I. Colonial: 0,39 como quería ACF, enviado por Letman
- Destacados: Comentario del cierre de los mercados europeos, enviado por invernews
- JAZZTEL: Por lo menos ha mantenido los 0,18 al cierre!!!, enviado por Nelo
- JAZZTEL: Pujals en estado puro, enviado por Duca
- Destacados: El lbex baja más de un 2%, comentario de mercado, enviado por invernews
- Destacados: Análisis técnico de Inditex y REE, enviado por invernews
- JAZZTEL: Subasta en 0,21 ojo, enviado por Duca
- I. Colonial: Buenos días!! 10 252976 0,44 0,44 54281 4, enviado por Nelo

Cotizaciones



ÍNDICES

FTSE	3880,72	0,15%
CAC	2952,65	-0,93%
DAX	4172,82	-1,12%
DOW JONES	7552,29	-5,56%
NASDAQ	1036,51	-4,70%
NIKKEI	7910,79	2,70%

+ SUBEN IBEX

SACYR VALLEH	8,13	10,46%
CRITERIA CAI	2,54	9,01%
ENAGAS	14,64	5,55%

+ BAJAN IBEX

TEC.REUNIDAS	15,44	-1,72%
INDITEX	23,78	-1,57%
TELEFONICA	14,69	-0,14%



Publicidad

DESDE

14

€

Encuesta

¿Crees que la tendencia inflacionista ha tocado techo?

- Si
- No


voto

Resultados Encuestas

votos 38

Recomendaciones

- CATALANA OCCIDENTE UBS recorta



Economía/Turismo.- El Gobierno apru

Portada	Confidencial	Por lo breve	Enormes minucias	Cartas al director	Exclusivas	Radio y Tele	Otras secciones
----------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	------------------------

Próxima edición: viernes, 21 de noviembre de 2008

jueves, 20 de noviembre de 2008

Edición: 3.042

[Hispanidad.com](#) > [Sanidad](#)3 de 8 en [Sanidad](#) < [Anterior](#) | [Siguiente](#) >

Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente



EuropaPress, viernes, 21 de noviembre de 2008 (13:48)

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London, que ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork, señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

Edita: López Samanes, S.L. | Director: [Eulogio López](#) | Redactor Jefe: [Rodrigo Martín](#) | Director Técnico: [Fernando Moreno](#) | Gerente: [Juana Samanes](#)

HISPANIDAD Periódico electrónico editado en España. C/ Recoletos 11, 28001-Madrid. Telf.915781135.

Fundado el 20 de marzo de 1996 (c) Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de Hispanidad.com sin autorización previa de la sociedad editora.

Salud

Se ha realizado en Reino Unido

Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS)

Un estudio señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

El estudio ha sido realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London y ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias

Más Noticias Más Leídas

- **Casi uno de cada 10 pacientes hospitalizados en servicios de Medicina Interna son alcohólicos de riesgo, según estudio**
- **Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente**
- **Identificar los genes responsables de los tumores es la base del futuro de la oncología, según un experto**
- **Los dentistas aseguran que cada año se podrían evitar 4.000 casos de cáncer oral si se acudiera más a la consulta**
- **Los bancos de sangre de cordón alcanzarán las 18.000 muestras en 2008**
- **El 15% de los niños europeos de 11 años reconoce haber fumado alguna vez**
- **Más de cien expertos comparecerán en la comisión parlamentaria de sanidad de Madrid que arrancará hoy**
- **Lavarse las manos reduciría a la mitad las**

realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.



muerres de recién nacidos en África

- **La depresión será la primera causa de enfermedad en el mundo desarrollado en 2020**
- **Un juez de EEUU ordena la puesta en libertad de cinco argelinos presos en Guantánamo**
- **Beber agua evitaría una de cada 10 hospitalizaciones de personas mayores**
- **El riesgo de infarto es 24 veces mayor con el consumo de cocaína**
- **Tres de cada cuatro adolescentes no están conformes con su aspecto físico**
- **El Premio Nobel de Medicina en 2007 abre hoy en Córdoba el II Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva y Salud**
- **Soria anuncia una inversión de 24 millones de euros para mejorar la Atención Primaria**
- **El tabaquismo hace que aumente en un 50% la posibilidad de muerte súbita en el lactante**
- **Desarrollan dos componentes que detienen la formación y expansión de los tumores de mama**
- **Un 12% de los niños entre 8 y 11 años sufre un trastorno mental**
- **Los españoles se están olvidando de la dieta mediterránea**
- **Las mujeres españolas viven más años que los hombres pero su calidad de vida es peor**
- **Gobierno valenciano considera "totalmente inadecuado" que una discoteca sortee una operación de cirugía estética**
- **El brócoli podría ayudar a los fumadores a prevenir el cáncer de pulmón**

Loterías

Largas colas de espera en la Administración de Loterías La Bruja de Oro.

La Administración Número 1 de España, **La Bruixa d'Or**, tiene que atender cada día a miles de personas que se acercan a por su Lotería. Ahora, te dan la oportunidad de poder comprar sus décimos por internet. [Saber más...](#)

Consigue tu **Guía 09**
de elEconomista
con los **100 mejores**
vinos y restaurantes

Salud

- [Portada](#)
- [Global](#)
- [España](#)
- [Bolsa y Economía](#)
- [Deportes](#)
- [Tecnología](#)
- [Medio Ambiente](#)
- [Cultura](#)
- [Gente y Estilo](#)
- [Motor](#)
- [elEconomista.es](#)

Estás en: [Portada](#) » [Salud](#) **Un estudio**

Buscar: en [EcoDiario.es](#)

asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente

13:19 - 21/11/2008



Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos)

Un estudio realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London, que ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork, señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de 'ftalatos' en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los 'ftalatos' son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de 'Environmental Health Perspectives', sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.



El flash de la actualidad

[Los universitarios catalanes amenazan con ocupar "indefinidamente" facultades - 14:49](#)

España | [Comenta](#)



[Obama y Barroso cooperarán contra el cambio climático - 14:42](#)

Desarrollo sostenible | [Comenta](#)


[Cristina Fernández expresa su satisfacción por el fin de las jubilaciones privadas - 14:39](#)

Latinoamérica | [Comenta](#)

[Ver todos](#)



Tienda



Casa Venta en Madrid. El portal inmobiliario líder.

PVP: 3.990.000,00 €



Piso en Venta Teruel. ¿Quieres independizarte?, ¡ven!

PVP: 25.000,00 €



La mejor tarifa única del mercado.

8cent/min a todos los operadores. Para contrato y prepago.

PVP: Consultar

- [Más leídas](#)
- [Últimas](#)
- [Más comentadas](#)

- [El dictador cobraba 800.000 pesetas al mes de dos sueldos](#)



www. .com

- Másteres
- Oposiciones
- Cursos
- Cursos de inglés

www.mastersadistancia.com

SIGLO XXI | DIARIO DIGITAL INDEPENDIENTE, PLURAL Y ABIERTO

69€ Móvil dual Funciona con dos SIMS simultáneamente
TVA y envío incluidos. Pequeño, LCD 2" táctil, FM, Cámara, 256 MB, Bluetooth...

Viernes, 21 de noviembre de 2008 • Actualizado a las 14:54 (CET) • El tercer diario digital más leído según OJD • Fundado en noviembre de 2003

[VIDEOS !](#) | [IMÁGENES](#) | [ÚLTIMA HORA](#) | [ENCUESTAS](#) | [EL TIEMPO](#) | [PÁGINAS BLANCAS](#) | [PÁGINAS AMARILLAS](#) | [CALLEJERO](#) | [CLASIFICADOS !](#)

| Más

OPINIÓN

Firmas
Viñetas

ENTREVISTAS Y
CHARLAS DIG.

ESPECIALES

PUBLICIDAD

aprendemas.com
• Cursos
• Másteres

Busca tu casa

ESPAÑA

INTERNACIONAL

DEPORTES

Fútbol
Baloncesto
Motor
Tenis
Balonmano
Ciclismo
Golf
Vela y Copa Am.
Atletismo
Más noticias

ECONOMÍA

Vivienda
Automóviles

CULTURA Y OCIO

Cine
Televisión
Música
Libros

SOCIEDAD

Sucesos y tribu.
Ciencia y salud
Religión
Prensa y medios
Educación
Gente

Gastronomía, vinos
y lugares
J. Ruiz de Infante

Toros

Ignacio de Cossio

PUBLICIDAD

zonok
in your zone

zoom.in
para tus negocios

Sanidad

Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente

Redacción / EP

Un estudio realizado en el Reino Unido y coordinado por el Imperial College London, que ha contado con la participación del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y el University College Cork, señala que las mujeres que están expuestas en su lugar de trabajo a laca para el pelo durante el primer trimestre de embarazo presentan más del doble de riesgo de que el bebé nazca con hipospadias.

La hipospadias es una de las anomalías congénitas más habituales de los genitales masculinos, en la que la abertura de la uretra se encuentra ubicada hacia la cara inferior del pene. Esto estaría motivado por la presencia de "ftalatos" en gran parte de las lacas, sustancias que se asocian a un descenso de la actividad de los andrógenos provocando malformaciones del sistema reproductivo como la hipospadias.

Los "ftalatos" son un grupo de compuestos químicos que se añaden habitualmente a los plásticos para incrementar su flexibilidad y que se encuentran presentes en otros productos como cosméticos o cables eléctricos, entre otros.

El investigador del CREAL Mark Nieuwenhuijsen aseguró que "es el estudio más amplio sobre hipospadias realizado hasta el momento, y el primero que pone de manifiesto un vínculo significativo entre la laca para el pelo y esta anomalía congénita". Los autores del estudio, que se publica en la edición online de "Environmental Health Perspectives", sostuvieron que los resultados del estudio pueden tener implicaciones en otros problemas reproductivos.

Recientemente se ha planteado que la hipospadias, la afección de testículos no descendidos, el semen con calidad deficiente y algunos tipos de cáncer testicular constituyen síntomas de un problema subyacente, la forma en la que el sistema reproductivo se desarrolla en el útero.

La hipospadias afectan aproximadamente a 1 de cada 250 niños del Reino Unido y los Estados Unidos, y en España se calcula que a 1 de cada 150, aunque los cálculos sobre la prevalencia varían. Generalmente, esta anomalía se puede tratar con cirugía correctiva una vez el niño ha cumplido un año.

El estudio también señala que la ingesta de complementos de ácido fólico durante los tres primeros meses del embarazo puede comportar una reducción del 36 por ciento del riesgo de dar a luz un hijo con esta enfermedad.

Los investigadores llegaron a sus conclusiones tras haber realizado entrevistas telefónicas detalladas a 471 madres, cuyos hijos habían sido derivados a cirujanos por hipospadias y a 490 pacientes de control, de 120 distritos municipales del sureste de Inglaterra.

Publicado el viernes 21 de noviembre de 2008 a las 13:48 horas.

» Enviar una carta al director

» Imprimir esta página

» Guardar y compartir

Menéame Wikio
 Google Blinklist
 Yahoo! Fresqui
 Windows Live Facebook
 Digg Newsvine
 Delicious Reddit
 Technorati

Otros textos de Sanidad

» Un estudio asocia la laca de pelo con una anomalía genital congénita frecuente

» Una empresa de crioconservación calcula que los bancos de sangre de cordón alcanzarán las 18.000 muestras en 2008

» Una empresa de crioconservación calcula que los bancos de sangre de cordón alcanzarán las 18.000 muestras en 2008

» El 15 por ciento de los niños europeos de 11 años reconoce haber fumado alguna vez, según estudio

» Más de cien expertos comparecerán en la comisión parlamentaria de sanidad de Madrid que arrancará hoy

Pequeño Ligero
Radio FM
LCD 2.0
Táctil
Cámara 1.3
256 Mb
MP3 / MP4
Bluetooth
Tribanda

Es hora de volar.

Península/Baleares -
Alemania desde **59€**

Islas Canarias -
Alemania desde **129€**

p.ej. a Munich, Frankfurt,
Colonia, Berlin, Hamburgo

Vuelos Intercontinentales
desde **199€**

p.ej. desde Frankfurt al Caribe, Brasil,
Canadá, África o al Océano Índico

precio final por
trayecto, servicio y
millas incl.

Volar es nuestra pasión.
Condor
www.condor.com

[Información corporativa](#) | [Estadísticas](#) | [Publicidad](#) | [Contacte con nosotros](#)

© SIGLO XXI | Director: Guillermo Peris Peris | Tel: (+34) 669 104458 | info@diariosigloxxi.com | Auditado por

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos. Toda responsabilidad derivada de los textos recae sobre sus autores. Reservados todos los derechos.